

ジェニナック錠を服用される患者さんへ

このお薬は、細菌の増殖をおさえ、殺菌作用を示します。
呼吸器や耳・鼻・のどなどの感染症の治療に使われます。
以下の注意をよくお読みいただき、正しく服用してください。

服用にあたっての注意点


- 通常、成人は1回2錠を**1日1回**服用しますが、必ず医師が指示した方法に従って服用してください。

服用し忘れた場合は、絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。



- 誤って多く服用した場合は**、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- ご自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。

●200mg錠(実物大)



●PTPシート



*裏面もご覧ください。●●●●▶

服用中に注意していただきたい症状

まれに以下のような症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合、副作用の初期症状である可能性があります。服用をやめて、すぐに医師の診察を受けてください。



- 発疹・じんましん
- 皮膚のかゆみ
- 体の一部または全身が赤くなる
- 息苦しくなる



- 目の充血
- 口の中や唇がただれる



- めまい
- 気が遠くなる
- ぼーっとする



- 動悸
- 脈がとぶ
- 胸の違和感

◎上記以外にも気になる症状やわからないことがありましたら、
医師または薬剤師にご相談ください。

医師または薬剤師の連絡先



大正製薬株式会社

2024年3月作成
No.66426