

子供が嫌がって 飲ませにくい時は？



お水の代わりにこのようなものに混ぜると
飲ませやすくなります。



アイスクリーム
(バニラや
チョコレートなど)



プリン



コンデンスミルク



お砂糖



ココアパウダー

- クリームパウダー・
ミルク(コーヒー用)
- ビーナッツクリーム

混ぜる量はお子さまが食べられる量にしてください。

※アレルギーをお持ちの際はご注意ください。

混ぜる時は？

● アイスクリームや練乳の場合

ペースト状に練ったお薬をアイスクリームで
包んだり、練乳にからめたりすると飲ませ
やすくなります。



● 粉状の食品の場合

お薬と食品をよく混ぜ、お水を数滴加えて
ペースト状にして食べさせてあげてください。



患者さん用

クラリスドライシロップを 服用されている方へ



服用方法

監修：元慶應義塾大学薬学部 教授 木津純子 先生

基本編

飲ませる直前に、少量のお水(小さじ1~2杯)
に混ぜて飲ませてあげてください。

※お湯は避けてください

小さなコップで



小さなスプーンで



- 作り置きはせず、飲ませる直前に混ぜてください。

飲ませた後は、すぐにお水を
飲ませてあげてください。



- 口の中に残ったお薬でにがくなることがあります。
- お水を飲むだけで不十分と思われる場合には、チョコレートやアイスクリームなどを食べさせるのも、にがみを防ぐ良い方法です。



大正製薬株式会社

小さなお子さまへの飲ませ方

● 指を使って

- ①お薬にお水を数滴加えてペースト状にします。
- ②きれいに洗った指で、頬の裏側か上あごに手早く塗ってください。



● スポイトを使って

- ①お薬に少量のお水を加えてシロップ状にします。
- ②スポイトに吸い取って、口の脇から頬の内側に流し込むように注入します。



● 乳首を使って

- ①お薬に少量のお水を加えてシロップ状にします。
 - ②なるべく普段使っていない哺乳瓶の乳首をくわえさせ、お薬を注ぎ吸わせませ。
- ※授乳前の方がうまくいきます。



いずれの場合にもお薬を飲ませた後は、
すぐにお水を飲ませてあげてください。



にがみを出さないために

このお薬は、以下の飲食物（酸性のもの）に混ぜるとにがくなります。



- 他のお薬と一緒に飲むとにがなることがあります。特に指示のない場合には、他のお薬と別々に飲ませてください。



- お話ができるようになったお子さまには、「なぜ、お薬を飲まないといけないのか?」を説明してあげることも大切です。上手に飲めたらほめてあげましょう。

