

ボンビバ®の注射を 受けられる患者さんへ



ボンビバ静注は月1回、
続けて注射を受ける骨粗しょう症の治療薬です。

- ボンビバ静注は骨の量を増やし、骨折を防ぎます。

承認時評価資料

Nakamura T, et al, Calcif Tissue Int 2013; 93: 137-146.

! いつもと違う以下のような症状に気がいたら、
ただちに主治医・看護師または薬剤師に連絡してください。

- 筋肉や関節などの痛み
- からだがだるい
- 歯のゆるみ
- 発熱
- あごの痛み
- 歯ぐきの腫れ

● 歯科受診の際には

- 抜歯などの歯の治療を受ける場合は、
あらかじめ主治医・看護師または薬剤師に相談してください。
- 歯科医にボンビバの注射を受けていることを必ず伝えてください。

● 次の方は注射を受けることはできません。

本剤または、本剤と同じ系統の薬剤に対する過敏症のある方、
低カルシウム血症の方、妊娠している方、
妊娠している可能性のある方、授乳中の方

さんの
次回の注射日は 月 日です。



骨粗しょう症の治療は


継続することがとても重要です。

月1回、医療機関を受診し、きちんと治療を続けましょう。

- 骨粗しょう症の薬で治療を続けた割合と
大腿骨近位部骨折のおこりやすさ

大腿骨近位部骨折のおこりやすさ

おこりやすい



きちんと治療を続ける

治療を続けることで
骨粗しょう症による骨折が
おこりにくくなります。

※ 大腿骨近位部：太もものつけ根の骨

医療機関名：



大正製薬株式会社