



# フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」を使用される方へ 上手な使い方



**1**  
キャップを回して  
開けます。




**2**  
容器のダイヤル(底  
部)を回して、薬剤を  
4~5mm出します。



**3**  
痛いところを中心  
にして、適量をまんべ  
んなくすり込みます。



ダイヤルを  
回して戻す。



しっかりと閉める。

**4**  
●使用後は容器のダイヤル(底  
部)を回して薬剤を戻し、薬剤  
が完全に容器に戻ったことを  
確認します。  
●**キャップをしっかり閉めて、**  
直射日光、高温の場所(車内な  
ど)を避けて保管してください。

**注意**▶

薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください(受け皿が皮膚に当たり、傷つける恐れがあります)。薬剤の量は受け皿を除き表示量確保されております。なお、薬剤を出し終わるとダイヤルは空回りする構造になっております。



ご使用の際には  
よくお読みください。

## 使用上の注意

- 以前にぜんそく発作を起こしたことがある方や現在ぜんそくの方、また以前にこの薬の使用により皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状を起こしたことがある方は使用前に担当医師・薬剤師に相談してください。
- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。
- この薬を塗った患部を通気性の悪いもので覆わないでください。
- この薬を使ったあと、かゆみ、かぶれ、発赤、ヒリヒリ感などの症状があらわれたときは、担当医師・薬剤師に相談してください。

## 保管および取扱い上の注意

- 揮発性があるので、使用後はキャップをしっかりと閉めて、直射日光、高温の場所(車内など)を避けて保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- 処方された患者さん以外の方は使用しないでください。